



Obst-Info Franken

- Erdbeeren und Beerenobst Nr. 7 vom 10.05.2022 -

Vegetationsentwicklung in frühen bis mittleren Lagen



Erdbeere-Freiland



Heidelbeere



Johannisbeere



Himbeere

Erdbeere: Unverfrühte Kulturen sind in Vollblüte. Heidelbeere: Vollblüte-Abblühen. Rote Johannisbeere: Fruchtwachstum. Himbeere: Die Blütenstiele sind gestreckt und die Blütenknospen trennen sich. In der Vegetationsentwicklung sind wir im Vergleich zum Vorjahr etwa 10 Tage voraus.

Wettervorhersage:

Heute und morgen ist es sehr sonnig und die Temperaturen erreichen Werte bis 29° C. Am Donnerstag gibt es wieder mehr Bewölkung bei Temperaturen um 24° C. Ab Freitag und über das Wochenende bleibt es sonnig mit Temperaturen zwischen 20 und 22° C. Die meisten Prognosemodelle melden derzeit für die nächsten Tage keine Niederschläge.

Bei allen Erdbeer- und Strauchbeerenkulturen auf ausreichende Bewässerungsgaben achten!

Erdbeeren

Zur Botrytisbekämpfung in blühenden Beständen empfehlen wir grundsätzlich 3 Behandlungen. Es stehen verschiedene Präparate zur Verfügung bei deren Auswahl die Anforderungen der jeweiligen Lieferanten beachtet werden sollten.

Beispiel einer möglichen empfehlenswerten Spritzfolge:

1. Blühbeginn: Switch (1 kg/ha – WZ: 7 Tage)
2. Vollblüte: Switch (1 kg/ha – WZ: 7 Tage)
3. Gegen Ende der Blüte: Luna Sensation (0,8 l/ha – WZ: 3 Tage)

Die gegenwärtige Witterung fördert den Befall durch Erdbeermehltau. Wirksame Fungizide: Flint (0,3 kg/ha – WZ: 3 Tage), Luna Sensation (0,8 l – WZ: 3 Tage), u.a..

Zur Bekämpfung von Spinnmilben kann, soweit die Wartezeit noch ausreicht, Kiron (3 l/ha – WZ: 21 Tage) eingesetzt werden. Alternativ Floramite 240 SC (0,4 l/ha – WZ: 21Tage).

Rechtzeitig, bevor sich die Fruchtstände absenken, auf Stroheinlage achten!

Strauchbeeren

Himbeeren

Kontrollen auf Befall durch die Gemeine Spinnmilbe durchführen. Zur Bekämpfung empfehlen wir den Einsatz von Kiron (1,5 l/ha – WZ: 21 Tage).

Gegen Rostpilze (Himbeerrost/Brombeerrost) sind folgende Präparate einsetzbar:

Vor der Blüte: Flint (0,2 kg) oder Score (0,4 l).

Während der Blüte: Folicur (0,8 l – WZ: 14 Tage) oder Signum (1 kg/ha – WZ: 3 Tage)

Auf starkwüchsigen Standorten kann jetzt auch ein nochmaliges Entfernen der Jungtriebe sinnvoll sein.

Johannisbeeren / Stachelbeeren

Die Erwärmung fördert jetzt Infektionen durch den Amerikanischen Stachelbeermehltau. Wir empfehlen anfällige Johannisbeer- und Stachelbeersorten vorbeugend zu behandeln.

Mittel: Flint (0,2 kg/ha – WZ: 14 Tage), Folicur (0,8 l/ha – WZ: 14 Tage), Kumar (5 kg/ha – WZ: 1 Tag), Nimrod EC (1 l/ha – WZ: 7 Tage), Signum (1 kg/ha – WZ: 14 Tage), Systhane 20 EW (0,45 l/ha – WZ: 14 Tage), Talus/Talendo (0,375 l/ha – WZ: 7 Tage).

In Johannisbeerkulturen, die als 3-Asthecken oder Spindeln gezogen werden, ist es wichtig die Leittriebe regelmäßig nach etwa 5 bis 6 Jahren zu erneuern. Von den neuen Bodentrieben müssen hierzu einige stehen gelassen werden. Das Vereinzeln solcher Triebe gelingt jetzt besonders einfach, da diese noch nicht verholzt sind und sich leicht ausreißen lassen.

Heidelbeeren

Insbesondere in Containerkulturen auf ausreichende Nährstoffversorgung/Fertigation achten. Einsatz von sauer wirkenden NPK-Düngern (Agriplant, Kristallon, ...) im Wechsel mit schwefelsaurem Ammoniak.

Um Salzsäuren zu vermeiden, nicht zu hohe Konzentrationen fertiggieren.

Beim Einsatz von Proportionaldosierern (Dosatron, Mixrite) EC-Werte von max. ca. 1,6 -1,8 (incl. EC-Wert des Wassers) einstellen.

Im Bypass-Verfahren, z.B. mit Düngetank, o.a. Einspeisungstechniken Gebrauchskonzentrationen von etwa 1 g Dünger pro Liter Wasser nicht überschreiten.

Zulassungen

Exirel (Cyantraniliprole) hat eine Zulassung für Notfallsituationen zur Bekämpfung der Kirschessigfliege an Roter, Weißer und Schwarzer Johannisbeere und Heidelbeere erhalten.

Details zur Zulassung finden Sie unter folgendem Link: https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/01_notfallzulassungen/Exirel_Kirschessigfliege_Johannisbeere_Heidelbeere_2022.html?nn=11031260

Termine

Alternative Unkrautregulierung für Obstbau und Baumschule

Maschinenvorführung am 25. Mai 2022; 9.00 – 17.30 Uhr

LWG Versuchsgelände für Obstbau und Baumschule, Am Stutel 3, 97291 Thüngersheim

Programm unter: <https://www.lwg.bayern.de/gartenbau/obstbau/185008/index.php>

Riehl