



Obst-Info Franken

- Erdbeeren und Beerenobst Nr. 8 vom 17.05.2022 -

Vegetationsentwicklung in frühen bis mittleren Lagen



Erdbeere-Verfrüht



Heidelbeere



Johannisbeere



Himbeere

Erdbeere: In mit Folie/Vlies verfrühten Kulturen hat die Ernte begonnen. Heidelbeere: Frühes Fruchtstadium. Rote Johannisbeere: Fruchtwachstum. Himbeere: Blühbeginn. In der Vegetationsentwicklung sind wir im Vergleich zum Vorjahr derzeit etwas über 2 Wochen voraus. Der Vegetationsstand ist ungefähr vergleichbar mit dem sehr frühen Jahr 2020. Voraussichtlich werden auch die Erntetermine ähnlich früh liegen wie 2020. Dies sollte bei der Planung der Ernteorganisation berücksichtigt werden.

Wettervorhersage:

Nach dem Durchzug der Gewitter ist für heute und die nächsten Tage wieder sonniges und sehr warmes Wetter mit Temperaturen bis 30 °C gemeldet. Einige Wetterdienste erwarten allerdings für Donnerstag/Freitag regional erneut Gewitter.

Erdbeeren

Zur Unkrautbekämpfung in Frigo-Neupflanzungen (ohne Beerntung) empfehlen wir, kurz nach dem Pflanzen, auf sauberen, feuchten Boden die Anwendung von Flexidor (0,4 kg/ha) + Devrinol (2,5 kg/ha – Aufbrauchfrist bis 30.06.2022). Alternativ kann nach dem Anwachsen (ca. 10 Tage nach der Pflanzung) eine Behandlung mit Spectrum (0,7 l/ha (max. 1,4 l/ha) + Betasana SC (3 l/ha) erfolgen.

Die gegenwärtige Witterung fördert den Befall durch Erdbeermehltau. Wirksame Fungizide: Flint (0,3 kg/ha – WZ: 3 Tage), Luna Sensation (0,8 l – WZ: 3 Tage), u.a..

Zur Bekämpfung von Spinnmilben kann, soweit die Wartezeit noch ausreicht, Kiron (3 l/ha – WZ: 21 Tage) eingesetzt werden. Alternativ Floramite 240 SC (0,4 l/ha – WZ: 21Tage).

Rechtzeitig, bevor sich die Fruchtstände absenken, auf Stroheinlage achten!

Strauchbeeren

Himbeeren/Brombeeren

Während der Blüte Maßnahmen zur Verhinderung von Botrytis Fruchtfäule durchführen. Einsetzbare Mittel: Switch (1 kg/ha – WZ: 10 Tage), Signum (1 kg/ha – WZ: 3 Tage), Teldor (2 kg/ha – WZ: 7 Tage).

In Befallslagen des Himbeerkäfers kann die Nebenwirkung von Mospilan SG (0,25 kg/ha – WZ: 7 Tage) genutzt werden.

Kontrollen auf Befall durch die Gemeine Spinnmilbe durchführen. Zur Bekämpfung empfehlen wir den Einsatz von Kiron (1,5 l/ha – WZ: 21 Tage).

Johannisbeeren / Stachelbeeren

In Johannisbeerkulturen, die als 3-Astheckenoder Spindeln gezo-
gen werden, sollten die Leittriebe jetzt bis zum ersten Draht (in
ca. 50 cm Höhe) aufgeputzt bzw. die Seitentriebe entfernt wer-
den. Dies dient der besseren Durchlüftung und fördert die Ent-
wicklung der verbleibenden Seitentriebe.



Die Hitze fördert jetzt Infektionen durch den Amerikanischen Stachelbeermehltau. Wir empfehlen anfällige Johannisbeer- und Stachelbeersorten vorbeugend zu behandeln.

Mittel: Flint (0,2 kg/ha – WZ: 14 Tage), Folicur (0,8 l/ha – WZ: 14 Tage), Kumar (5 kg/ha – WZ: 1 Tag), Nimrod EC (1 l/ha – WZ: 7 Tage), Signum (1 kg/ha – WZ: 14 Tage), Systhane 20 EW (0,45 l/ha – WZ: 14 Tage), Talus/Talendo (0,375 l/ha – WZ: 7 Tage).

Allgemeine Hinweise

- PS-Maßnahmen derzeit nur in den kühleren Morgenstunden durchführen!
- Auf Blattdünger- und Netzschwefelzusätze verzichten!
- Auf ausreichende Bewässerung achten!

Riehl