



Obst-Info Franken

- Erdbeeren und Beerenobst Nr. 13 vom 19.10.2022 -

Vegetationsentwicklung:

Herbstfärbung und beginnender Blattfall.

Wettervorhersage:

Während es heute nach Nebelauflösung zumeist sonnig ist, verläuft der morgige Donnerstag überwiegend bewölkt. Am Freitag scheint wieder häufiger die Sonne, dabei fallen aber vereinzelte Regenschauer. Die Temperaturen steigen von 17° C heute auf 21° C am Freitag.

Strauchbeeren

Seit Inkrafttreten der 5. VO. zur Änderung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung im vergangenen Jahr ist der Einsatz glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel stark eingeschränkt. Die Anwendung ist grundsätzlich nur noch im Einzelfall zulässig, wenn andere Maßnahmen nicht geeignet oder zumutbar sind. **In Naturschutz- und Wasserschutzgebieten ist kein Einsatz mehr erlaubt.**

Bei starker Verunkrautung ist in johannisbeerartigem Beerenobst eine Spät-/ Winteranwendung von Roundup Rekord (2,5 kg/ha) möglich. Die Maßnahme muß mit entsprechender Vorsicht (Spritzschirm) erfolgen, um Schäden an den Sträuchern zu vermeiden. Insbesondere dürfen bei der Applikation auch keine frischen Wunden getroffen werden. Geplante Behandlungen sollten daher nur mit entsprechendem Abstand (mind. 6 Wochen) zu vorausgegangenen Schnittmaßnahmen durchgeführt werden.

Speziell gegen Gräser ist in himbeer- und johannisbeerartigem Beerenobst auch der Einsatz von Fusilade MAX (2 l/ha) oder Select 240 EC (0,75 l/ha) möglich.

In der Vegetationsruhe, bei Temperaturen unter 10 °C, ist der Einsatz von Kerb Flo in Johannisbeeren (6,25 l/ha), Stachelbeeren (6,25 l/ha), himbeerartigem Beerenobst (3,75 l/ha), Schwarzem Holunder (3,75 l/ha) und Heidelbeeren (3,75 l/ha) möglich.

Diese Maßnahme wird insbesondere in Schutzgebieten, in denen kein Glyphosat-Einsatz mehr erfolgen darf, empfohlen.

Erdbeeren

Zur Bekämpfung von Unkräutern und Ausläuferpflanzen sollte, soweit notwendig, jetzt noch eine kombinierte mechanisch/chemische Maßnahme erfolgen. Hierbei kann zunächst zwischen den Reihen flach ge-
fräst werden. Alternativ bzw. ergänzend zum Fräsen kann zwischen den Reihen auch eine Kastenbehandlung mit Quickdown (0,8 l/ha) + Toil (2 l/ha) erfolgen.

Zur Versiegelung kann anschließend, auf weitgehend sauberen Boden, der Einsatz von z.B.:

- Goltix Gold (2 l/ha) + Flexidor (0,4 l/ha)

erfolgen.

Eine Anwendung von Kerb Flo + Stomp Aqua darf erst bei völliger Winterruhe der Erdbeerpflanzen erfolgen. Hierzu müssen einige Tage mit Nachfrösten vorausgehen und die Tagestemperaturen idealerweise im einstelligen Bereich liegen. Dies ist bei uns meistens nicht vor Mitte bis Ende Dezember der Fall.

Riehl