



Obst-Info Franken

- Erdbeeren und Beerenobst Nr. 7 vom 25.04.2023 -


Vegetationsentwicklung in frühen bis mittleren Lagen



Erdbeere (Tunnel)



Erdbeere-(Freiland)



Heidelbeere



Himbeere

Erdbeeren: Erntebeginn im Tunnel. Blühbeginn bei unverfrühten Freilandkulturen. Himbeeren / Brombeeren: Blättentfaltung der Seitentriebe. Heidelbeeren: Blühbeginn. Rote Johannisbeeren: An Frühsorten sind 80 - 100 % der Blüten der Trauben geöffnet. In der Vegetationsentwicklung sind wir, im Vergleich zum Vorjahr, etwa 5 bis 6 Tage zurück.

Wettervorhersage:

Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es, bei einem Mix aus Sonne und Wolken trocken. Die Temperaturen steigen von 11 °C am Mittwoch auf 16 °C am Donnerstag. In den Nächten ist gebietweise mit leichtem Luftfrost und verbreitet mit Bodenfrost zu rechnen. Am Freitag muß bei Temperaturen um 16 °C mit Niederschlägen, teils in Form von Gewittern, gerechnet werden.

Erdbeeren

Für heute und morgen Nacht ist verbreitet Bodenfrost gemeldet. Erdbeeren zudecken!

Zur Botrytisbekämpfung im Freiland empfehlen wir grundsätzlich 3 Behandlungen. Es stehen verschiedene Präparate zur Verfügung bei deren Auswahl die Anforderungen der jeweiligen Lieferanten beachtet werden sollten.

Beispiel einer empfehlenswerten Spritzfolge im Freiland:

1. Blühbeginn: Switch (1 kg/ha – WZ: 7 Tage)
2. Vollblüte: Switch (1 kg/ha – WZ: 7 Tage)
3. Gegen Ende der Blüte: Luna Sensation (0,8 l – WZ: 3 Tage)

Strauchbeeren

Johannisbeeren / Stachelbeeren

Zur Mehltaubekämpfung an anfälligen Sorten Behandlungen mit spezifischen Fungiziden durchführen. Wirkstoffe wechseln!

Einsetzbare Mittel: Flint (0,2 kg/ha), Talius/Talendo (0,375 l/ha), Nimrod EC (1 l/ha), Signum (1 kg/ha), Folicur (0,8 l/ha)

Zur Befallsminderung: z.B. Kumar (5 kg/ha), Vitisan (5 kg/ha).

Heidelbeeren

Insbesondere in Containerkulturen auf ausreichende Nährstoffversorgung/Fertigation achten. Einsatz von sauer wirkenden NPK-Düngern (Agriplant, Kristallon, ...) im Wechsel mit schwefelsaurem Ammoniak.

Um Salzs Schäden zu vermeiden, nicht zu hohe Konzentrationen fertiggieren.

Beim Einsatz von Proportionaldosierern (Dosatron, Mixrite) EC-Werte von max. ca. 1,6 -1,8 (incl. EC-Wert des Wassers) einstellen.

Im Bypass-Verfahren, z.B. mit Düngetank, o.a. Einspeisungstechniken Gebrauchskonzentrationen von etwa 1 g Dünger pro Liter Wasser nicht überschreiten.

Zulassungen

Exirel (Cyantraniliprole) hat eine Zulassung für Notfallsituationen im Pflanzenschutz zur Bekämpfung der Kirschessigfliege an Johannisbeeren und Heidelbeeren außerhalb von Wasserschutzgebieten erhalten. Die Zulassung wird für die Zeit vom 15. Mai bis 11. September 2023 für 120 Tage erteilt.

Aufwand: 0,75 l/ha. Max. 2 Anwendungen. Wartezeit: 3 Tage.

Weitere Details zur Zulassung unter:

https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM/01_ZugelPSM/02_Notfallzulassungen/psm_ZugelPSM_notfallzulassungen_node.html;jsessionid=1F8A969955CDC540E46E144345A4A5CE.internet972#doc11031262bodyText4

Riehl