



Obst-Info Franken

- Kern- und Steinobst Nr. 11 vom 12.04.2023 -

** Unsere Hinweise erfolgen in Zusammenarbeit mit dem Obstinformationszentrum Hiltboldstein. In sehr späten Lagen Frankens werden die unten beschriebenen Entwicklungen/Ereignisse ggf. erst in etwa 10 Tagen erreicht.*

Vegetationsentwicklung in frühen bis mittleren Lagen Frankens



Apfel (Jonagold)



Birne (Williams)



Süßkirsche (Bellise)



Zwetschge (C. Schöne)

Apfel: Grüne Knospe. Zwetschgen: Vollblüte. Kirschen: Frühsorten sind aufgeblüht. Im Vergleich zum Vorjahr sind wir in der Vegetationsentwicklung etwa 3 bis 4 Tage zurück.

Wettervorhersage

Heute bleibt es dicht bewölkt mit immer wiederkehrenden Niederschlägen. Morgen lockert es etwas auf, wobei weiterhin mit Regenschauern gerechnet werden muß. Der Freitag verläuft überwiegend sonnig und trocken bei Temperaturen bis 14 °C, während für das Wochenende erneut Regen gemeldet ist. Für die neue Woche zeigen die Prognosen derzeit einen Trend zu wärmerem und trockenerem Wetter.

Kernobst

Die aktuelle Schorfprognose für Ihre Region finden Sie unter folgendem Link:

https://www.wetter-by.de/Internet/global/startpage.nsf/start/RIMpro_by?OpenDocument

Behandlungen aus den letzten 4 bis 5 Tagen bieten derzeit noch einen Schutz vor Schorfinfektionen. Da für Samstag und Sonntag erneut Niederschläge gemeldet sind, empfehlen wir den Belag am Freitag mit z.B. Delan WG (0,25 kg) oder Mawin WG (0,6 kg) zu erneuern. In Anlagen, in denen die letzte Behandlung in der Vorwoche erfolgt ist, empfehlen wir den Zusatz von Präparaten wie z.B. Belanty (1,3 l / 10.000 m² Laubwandfläche), Score (0,075 l), Chorus (0,15 kg) oder Scala (0,375 l). Alternativ Solo-Einsatz von Syllit (0,625 l).

In Befallslagen der Birnengallmücke empfehlen wir vor Blühbeginn eine Behandlung mit Mospilan SG (0,125 kg). Wo eine Bekämpfung von Baumwanzen vor der Blüte geplant ist, kann auch die Zusatzwirkung von Karate Zeon (0,0375 l) im Rahmen der erteilten Notfallzulassung genutzt werden.

Weitere ggf. anstehende insektizide Behandlungen sollten aufgrund der kühlen Witterung auf nächste Woche verschoben werden.

Ölbehandlungen gegen die Eier der Roten Spinne sollten bis zum Stadium Rote Knospe erfolgen. Am günstigste dürfte es sein, eine solche Maßnahme für nächste Woche einzuplanen.

Mittel: z.B. Para Sommer (10 l).

3 Tage vor und nach Ölanwendungen sollte kein dithianon- bzw. captanhaltiges Produkt eingesetzt werden.

Steinobst

Blühende Kirschen- und Zwetschgensorten gegen Monilia behandeln.

Mittel:

- Teldor (0,5 kg) – Die Aufbrauchfrist des Mittels endet am 30.06.2023
- Flint (0,167 kg)
- Signum (0,25 kg)
- Luna Experience (0,2 l)
- Kumar (1,5 kg)
- Belanty (1 l/10.000 m² LWF)

Kontrollen auf Befall durch Frostspanner durchführen!

Notwendige insektizide Maßnahmen ggf. für nächste Woche einplanen!

Zwetschgensorten und Mirabellen, die zu Überbehang / Alternanz / Kleinfrüchtigkeit neigen, können während der Blühphase mit Agro N fluid (25 bis 30 l pro ha) ausgedünnt werden.

Soweit nicht anders erwähnt, beziehen sich die genannten Mittelmengen auf l bzw. kg pro ha und 1 m Kronenhöhe.

Riehl